

Molluscum contagiosum bei Kindern: Dauert länger als gedacht

Molluscum contagiosum in Children: Lasts Longer than (Previously) Assumed


Molluscum contagiosum zählt weltweit zu den 50 häufigsten Erkrankungen bei Kindern. Wie lange dauert es, bis *Mollusken bei Kindern* spontan verschwinden? Länger, als Sie vielleicht annehmen.

In einer britischen Studie mit 306 Kindern zwischen 4 und 15 Jahren konnten 269 nachverfolgt werden. Zwar betrug die *mittlere* Zeit bis zur Abheilung „nur“ 13,3 Monate, 30 % der Mollusken aber waren nach 18 Monaten und 13 % nach 24 Monaten immer noch vorhan-

den. Die Übertragung auf andere Kinder im selben Haushalt erfolgte in 41 %.

Nach diesen Daten erscheint es unabdingbar, die Eltern betroffener Kinder über die realistische zeitliche Entwicklung dieser lästigen Hautinfektion zu informieren.

Olsen JR. Time to resolution and effect on quality of life of molluscum contagiosum in children in the UK: a prospective community cohort study. *Lancet Infect Dis* 2015; 15: 190–95



nl.wikipedia/E van Herk

Abbildung Molluscum contagiosum (Nahansicht)

Penisfraktur

Penile Fracture

Das Bild, das Sie hier sehen, wird von Urologen als „klassische Auberginen-Deformität“ bezeichnet. Das sichtbare Hämatom des Penis-Schafts („**Penisfraktur**“) entsteht durch einen frontalen Anprall des erigierten Gliedes auf ein festes Hindernis – was auch immer das beim Sex sein kann. Die Verletzung ist ein Notfall und In-

dikation für eine sofortige operative Versorgung.

Ein ähnlicher Fall wird im *The New England Journal of Medicine* beschrieben.

Hartman RK. Penile fracture. *N Engl J Med* 2015; 372: 1055. Frei verfügbar unter <http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1404224>



wikipedia/Sevgi Ozcan and Ersin Akpinar

Abbildung Penisfraktur bei einem 32-jährigen Patienten



Ständig aktualisierte Veranstaltungstermine von den „Tagen der Allgemeinmedizin“ finden Sie unter

www.tag-der-allgemeinmedizin.de